

جدول مكافحة المتكاملة لأهم الحشرات على التفاح - عكار

مراحل نمو الثمار							فترة الرقود	الحشرات
عدد أيام تطور الثمار بعد العقد حتى آخر الصيف	سقوط البتلات	أزهار	الطربوش الأحمر	تفتح البراعم	تحرك البراعم	فترة الرقود		
70 يوم	60 يوم	50 يوم	40 يوم	30 يوم	20 يوم	10 أيام		
							مراقبة البيض	من أخضر ورمادي المراقبة: بالعين المجردة
							زيت شتوي	
							مراقبة الحوريات والأطوار البالغة وجود حوريات وأطوار بالغة بنسبة 1% مكافحة كيميائية	
								من قطني
							مراقبة الحوريات والأطوار البالغة إصابة 10% من الطرود مكافحة كيميائية	
							مراقبة البيض	أكاروز المراقبة: بالمجهر والعين المجردة
							مراقبة الحوريات والأطوار البالغة نيسان - أيار: إصابة 60% من الأوراق حزيران - آب: إصابة 30% من الأوراق مكافحة كيميائية	
							مراقبة البيض عند فقس 50% من البيض مكافحة كيميائية	
								عثة التفاح أو "السوسة" المراقبة: بالمصائد الفيرومونية
							مراقبة الأطوار البالغة رصد 3 فراشات بالمصائد الفيرومونية مكافحة كيميائية بعد 6 أيام مكافحة كيميائية أو غير كيميائية	
								حفار الساق المراقبة: بالعين المجردة
							مراقبة الأطوار البالغة إصابة 5% من الطرود مكافحة كيميائية	
							إزالة الدودة من داخل النفق بواسطة شريط معدني	

تبدأ المكافحة عندما تتخطى نسبة الإصابة «العتبة الاقتصادية» أو الفترة الحرجة وهو الحد الذي من بعده تصبح قيمة الأضرار أكبر من كلفة المكافحة (راجع معلومات كل حشرة أو إصابة)

المكافحة

العتبة الاقتصادية الضارة

المراقبة

مفتاح

مشروع تحسين الوضع المعيشي لصغار مزارعي عكار: فنيديق - مشمش - عكار العتيقة

تم تنفيذ هذا المنشور بدعم من الاتحاد الأوروبي. إن جمعية مدى هي المسؤولة الوحيدة عن محتويات هذه المطبوعة التي لا يمكن بأي حال أن تعكس وجهات نظر الاتحاد الأوروبي

