

# تأسيس بساتين التفاح والإختيار الصحيح لأهم الأصول والاصناف لمنطقة عكار

## تأسيس البستان

### اختيار الموقع

- تجنب المناطق المعرضة للرياح القوية
- توفر مياه الري
- يجب ان تكون الأرض معرضة للشمس

### تهيئة التربة

- نقب الأرض على عمق 80 الى 90 سم تقريبا
- حراة التربة على عمق 25 الى 30 سم تقريبا
- اضافة السماد العضوي والاسمدة الكيميائية البطيئة الحركة:
- البوتاسي والفوسفات P & K
- تجنب الاراضي الموبوءة (Verticillium sp & Phytophthora sp)
- والتي تعاني من مشكلة الرطوبة

### التخطيط

الهدف من التخطيط هو الحصول على :  
خطوط زراعة مستقيمة ومتوازنة


**شروط اختيار الشتول**  
يجب اجراء تحليل للتربة قبل زراعة الشتول لاختيار الأصل  
والصنف الملائمين

**عند اختيار الشتول يجب أن يراعى ما يلي :**  
توازن ما بين المجموع الجذري والغطاء النباتي  
ذات رأس واحد (ملك) وأغصانها موزعة بصورة متجانسة  
موثوقة المصدر لناحية خلوها من الأمراض  
تطابق الأصل (rootstock) والصنف (variety)



ان الشتول الموثوقة المصدر خالية من الامراض  
المعدية التي يصعب مكافحتها بالطرق المباشرة

## الاصناف الملائمة لمنطقة عكار



scarlet spur  
Scarlet Spur



super chief  
Super Chief



jeromine  
Jeromine



ruby gala  
Ruby Gala  
shniga gala  
Schniga Gala

- ثمار شامطة الطول إلا أنه يمكن أن لا تكتسب الشمطية التي تميز هذا الصنف في السنوات الأولى من الإنتاج
- ثمار دائيرية الشكل كبيرة الحجم
- لون أحمر داكن
- يفضل زراعته بالمناطق العالية المتوسطة والعالية من 900 م
- ثمار شامطة الطول إلا أنه يمكن أن لا تكتسب الشمطية التي تميز هذا الصنف في السنوات الأولى من الإنتاج
- كثيرة الحجم
- لون أحمر داكن لامع
- يفضل زراعته بالمناطق العالية ابتداءً من 900 م
- لون زهري إلى أحمر
- يمكن استخدامه كملحق للرد ديليسيس مماثلة لاصناف غولدن Golden
- يمكن زراعته في كافة مناطق زراعة التفاح

- قابل للتبريد لفترة 6 أشهر شرط أن يسمد وفقاً لبرامج التسميد
- قابل للتبريد لفترة طويلة (من 6 إلى 9 أشهر تقريباً)
- شرط أن يسمد وفقاً لبرامج التسميد لبرامج التسميد المتوازنة
- حساس للتبعق والعناكب الحمراء والمنقطي
- حساس للتبعق والعناكب الحمراء ولكن مقاوم للرمد واللفحة النارية
- لكنه مقاوم للرمد واللفحة النارية
- حساس لدرجات الحرارة المنخفضة
- قابل للتبريد لفترة قصيرة (1 إلى 3 أشهر تقريباً)
- ينصح بتسويقه مباشرة للاستفادة من باكوريته (متوسط الباكورية)
- حساس للتبعق والعناكب الحمراء والمنقطي
- لكنه مقاوم للرمد واللفحة النارية
- حساس لدرجات الحرارة المنخفضة
- حساس للقشب والرمد

